劉涓子鬼遺方

秘製大黃清寧丸方

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

劉涓子鬼遺方

龔慶宣撰

本館據讀畫齋叢書本排印初編各叢書僅有此本

劉涓子鬼遺方卷第一 并序

南北朝 龐安常撰

昔劉涓子晉末於丹陽郊外照射忽見一物高二丈許射而中之如雷電聲若風雨其夜不敢前過詰旦率門徒子弟數人尋蹤至山下見一小兒提罐問何往爲我主被劉涓子所射取水洗瘡而問之兒曰主人是誰人云黃父鬼仍將小兒相隨還來至門聞搗藥之聲比及遙見三人一人開書爾乃齊唱叫突三人並走遺一卷癰疽方并藥一臼時從宋武北征有被瘡者以藥塗之即愈論者云聖人所作天必助之以此天授武王也於是用方爲治千無一失姊適余從叔祖涓子寄姊書具敍此事并方一卷方是丹陽白薄紙本寫今手跡尚存從家世能爲治方秘而不傳其孫道慶與余鄰居情款異常臨終見語家有神方兒子幼稚苟非其人道不虛行尋卷診候兼辨藥性欲以相傳屬余既好方術受而不辭自得此方於今五載所治皆愈可謂天下神驗劉氏昔寄龔方故草寫多無次第今輒定其前後族類相從爲此一部流布鄉曲有識之士幸以自防齊永元元年太歲己卯五月五日撰道慶曰王祖母劉氏有此鬼方一部道慶祖考相承謹按處治萬無一失舅祖涓子兄弟自寫寫稱云無紙而用丹陽錄永和十九年資財不薄豈復無紙是以此別之耳。案永和祇十二年且去宋武甚遠疑元嘉之訛。

黃父曰夫言癰疽何以別之岐伯答曰榮衞稽留於經脈之中久則血澀不行血澀不行則衞氣從之不

通。壅遏不得行。火不止。熱勝。熱勝則肉腐爲膿。然不能陷膚。於骨髓不爲燋枯。五藏不爲傷。故曰癰。黃父曰何爲疽。岐伯曰熱氣浮盛。當其筋骨。良肉無餘。故曰疽。疽上皮肉以堅。上如牛領之皮。癰者薄以澤。背其候也。黃父曰。及如所說。未知癰疽之性名。發起處所。診候形狀。治與不治。死活之期。願一一聞之。

岐伯曰癰疽圖曰。

赤疽發額。不寫十餘日死。其五日可刻也。其膿赤多血。死。未有膿可治。人年　二十五。　三十一。　六十。　九十五者。在額不可見血。見血者死。

禽疽。發如軫者數十數。其四日腫合。牽核痛。其狀若攣。十日可刻。其肉發身核寒。齒如噤。欲痓。如是者十五日死。

杼疽發頂。若兩耳下不寫。十六日死。六日可刻。其色黑。見膿而癰者死不可治。人年　十九。　二十三。　三十五。　三十九。　五十一。　五十五。　六十一。　八十七。　九十九。百神在耳下。不可見血。見血者死。

丁疽發兩肩比起有所逐。惡結血流。內外榮衞不通。發爲丁疽。三日。身腫痛甚。口噤如痓狀。十一日可刻。不治二十日死。

蜂疽發髀背。起心腧。若連肩骨。二十日。不治死。八日可刻。其色赤黑。膿見青者。死、不可治。人年　一十八。

二十四。三十五。六十七。七十二。九十八者。百神在肩。不可見血。見血者死。

陰疽發髀。若陰股。始發腰強。內不能自止。數飲不能多。五日堅痛。不治、三歲而死。

刻疽發起肺腧。不寫。二十日死。其八日可刻。發而赤。其上肉如椒子者死不可治。人年十九。二十五。二十九。三十九。五十七。六十。七十三。八十一。九十七。百神在背。不可見血。見血者死。

脈疽發頸項。如痛身隨而熱。不欲動悄悄。或不能食。此有所大畏恐駭。而不精。上氣嗽。其發引耳不可以腫。二十日可刻。不刻八十日死。

龍疽發背。起胃俞。若腎俞。二十日不寫死。九日可刻。不刻。其上赤下黑。若青膿黑死。發血膿者不死

首疽發熱八十日。一方云八九日。大熱汗。頭引血盡。如嗽。身熱同同如沸者。皮頗腫、淺、刻之。不刻、二十日死。

榮疽發脊。起若兩肘頭。二十五日不寫死。九日可刻。膿多赤白。而可治也。人年一歲。十六。二十六。三十二。四十八。五十八。六十四。八十。九十六。百神在脊。不可見血。見血卽死。

行疽、發如腫或後合相從。往來。不可。要其所在刻之。卽愈。

勇疽發股。起太陰。若伏鼠。二十五日不寫死。其十日可刻。勇疽發膿青黑者死。白者尙可治。不可治。人年

十一。十五。二十。三十一。三十三。四十六。五十九。六十三。七十五。九十一。百神皆在尻尾。不可見血。見血者死。

摽叔疽發背。熱同同。耳聾後六十日腫。如聚水。其狀若如此者可刻之。但出水後。及有血出。卽除。愈也。不可治。人年五十七。六十五。七十三。八十一。九十七者。百神在背。不可見血。見血者死。

瘍疽發足趺。若足下。三十日不寫。死。其十二日可刻。瘍疽者白膿不太多。其瘡上痒赤黑者死。不可治。人年十三。二十九。三十五。六十一。七十三。九十三。百神在足。不可見血。見血者死。

衝疽發小腸。痛而振寒熱。四日五日悄悄。六日而變。刻之。五十日死。

敦疽發兩指頭。若五指頭。七八日不寫。死。其四日可刻。其發而黑擁者不堪。未過指節。可治。一方不呼爲敦疽。恐是刺寫。明堂引爲敗疽。

疥疽發腋下。若兩臂兩掌中。振寒熱而噎乾者。飲多卽嘔。心煩悄悄。六十日而漸合者。如此可有汗。如無汗者死。一方云床疽。明堂亦引爲床疽。

筋疽皆發脊兩邊大筋。其色蒼。八日可刻。若有膿在肌腹中。十日死。

陳乾疽發兩臂。三四日痛不可動。五十日身熱而赤。六十日可刻。如刺無血。三四日病愈。

搔疽發手足五指頭。起節。其色不變。十日之內可刺。過時不刺。後爲蝕。有癰在脈腋。三歲死。

叔疽發身腫。牽核。而身熱。不可以行。不可以屈申。成膿、刺之以除。

白疽發脾。若肘後。痒。自痛傷。乃身熱多汗。五六處有者。死。心主癰疽。在股脛六日死。發膿血六十日死。

黑疽、發腫。居背大骨上。八日可刺。過時不刺爲骨疽。

骨疽、膿出不可止。壯熱。碎骨。六十日死。脇少陽。有癰腫在頸。八日死。發膿血者十日死。

倉疽、發身。痒後痛。此故傷寒氣入藏。篤。發爲倉疽。九日可刺之。不刺。九十日死矣。

腰太陽脈有腫。交脈屬於陽明。在頸。十日死。發腫七十日死。

尻太陽脈有膿腫。癰在足心少陽。八日死。發膿血六十日死。或八十日死。

頭陽明脈有腫。癰在尻。六日死。發膿血六十日死。

股太陰有腫。癰在足太陽。十七日死。發膿血百日死。

肩太陽脈有腫。癰在頸。八日死。發膿血百日死。

足少陽脈有腫。癰在脇。八日死。發膿血六百日死。

手陽明脈有腫。癰在腋淵。一歲死。發膿三歲死。

黑疽發腋淵死。

黑疽發耳中如米大。此疽不治死。

黑疽發肩死。黑疽發缺盆中。名曰伏疽。不治死。

赤疽發於脾。半夜可治。出歲死。

黑疽發肘上下。不死。可治。

髀解除指本黑頭赤。死。

黑疽發掌中。不死。可治。

赤疽發陰股。軟可治。堅死。

赤疽發肥腸。死。

黑疽發腄臏。軟可治。堅不可治。

赤疽發掌中。不可治。

黑疽發趺上。堅。死。

足下久腫。癰色赤。死。

癰高而光者。不大熱。用薄雍。其肉平平無異而紫色者。不須治。但以黃耆幷淡竹葉湯申其氣耳。癰平而痛。用八物黃耆薄。大癰七日。小癰五日。其自有堅強色診。寧生破。發背及發乳。若熱。手近不得者。令人之

熱熟。先服王不留行散。外散。外摩發背大黃膏。若背生破無善在乳者。熟之候。手按之。若隨手起。便是熟。針法要膿看。以意消息之。胷背不可過一寸。針良久不得膿。卽以食肉膏散差瓮頭肉。癰口中人體熱氣歇。服木瓜散。五日後癰欲差者。排膿內寒散。

凡破癰之後。病人便連綿欲死。內寒熱腫自有。似癰而非者。當以手按腫上。無所連。是風毒耳。勿針。可服昇麻湯。外摩膏破癰口當合流下三分。近一分針。唯令極熱。便不痛。破癰後敗壞不差者。作猪蹄湯洗之。日再下湯。二日故可用。疼六七日。湯半劑。亦可用。胸中斷氣。斷氣者當入闇中。以手按左眼視右眼。見光者胸中結癰。若不見光者。熛疽內發。針傷脈。血不出。住實不寫。留成癰。腎脈來者大漸小陰結。若肌肉痺癰癤爲發。寸口如此來大。如未漸小矣。

有黑色者。是石留黃毒。有赤色者。是丹砂毒。有青色者。是硇砂毒。有似鹽顆者。是鍾乳毒。有黃水者。是杏桃人毒。有白水者。是附子乾薑毒。有膿者。熱肉麪等毒。硇砂發。白雄鴨頂上血一合。已來。取黑鉛湯一茶椀。調服之。解。鍾乳發。雄雞肘上血一合。將鐵粉湯一茶椀調服之。解。附子發。取附子皮三半。豉半升相和。以水一升煎。約一茶椀。服之。解。丹砂發。取黑鉛、黃耆、防風、伏龍肝、各半兩。水一升。煎半茶椀。去滓。服之。解。

劉涓子鬼遺方卷第二

治金瘡止血散方
治金瘡血肉瘻蝙蝠散方
治金瘡肉瘻蒲黃散方
治金瘡箭肉中不出白蘞散方
治金瘡中腸出小麥散方
治金瘡腸出欲入礦石散方
治金瘡煩悶止煩白芷散方
治金瘡先有散石消石散方
治金瘡痛不可忍當歸散方
治金瘡弓弩所中悶絕琥珀散方
治金瘡弓弩所中筋急弩筋散方
治金瘡內傷蛇銜散方

治金瘡中筋骨續斷散方
治金瘡煩疼麻黃散方
治金瘡煩滿白薇散方
治金瘡去血當歸散方
治金瘡去血多虛蓯蓉散方
治金瘡內塞澤蘭散方
治金瘡內塞黃耆散方
治金瘡中茵藥藍子散方
治金瘡大渴矍麥散方
治被打腹中瘀血蒲黃散方
治癰疽金瘡止痛生肉膏方
治癰疽金瘡生肉甘菊膏方
治癰疽金瘡生肉膏方
治金瘡腹內瘀血烏雞湯方

治金瘡內有瘀血未及得下。烏雞湯方

治金瘡有瘀血。桃核湯方

治金瘡驚悸。狍心湯方

治金瘡癰疽生肉膏方

治被打有瘀血。白馬蹄散方

治金瘡。止血散方

烏章根三兩。　白芷一兩。　鹿茸二分。燒灰。　當歸一兩。　芎藭一兩。　乾地黃一兩。切。蒸。　續斷一兩。

右七味。擣篩令調。著血出處卽止。

治金瘡血肉瘻。蝙蝠消血散方

蝙蝠三枚。燒令煙盡。沫下絹篩之。

右以水服方寸匕。一日服令盡。當下如水血消也。

治金瘡肉瘻。蒲黃散方。

七月七日麻勃一兩。　蒲黃二兩。

右二物擣篩爲散。溫酒調服一錢匕。日五服。夜再兩服。

治金瘡箭肉中不出。出箭。白斂散方

白斂二兩　半夏三兩。湯洗七遍。生薑浸一宿。熬過

右二味爲末。調水服方寸匕。日三服。若輕淺瘡。十日出。深二十日出。終不停住肉中。

治金瘡中腹。腸出不能內之。小麥飲噴瘡方

取小麥五升。水九升。煮取四升。去滓。復以綿度濾之。使極冷。傍含噴之。瘡腸自上漸漸入。以冷水噴其背。不中多人見。亦不欲令傍人語。又不可病人知。或晚未入。取病人席四角。令病人舉搖。須臾腸便自入。十日之內不可飽食。頻食而宜少。勿使病人驚。驚則煞人。

治金瘡腸出欲入。礎石散方

礎石三兩　滑石三兩

右二物下篩。理令調。飲日方寸匕。日五服。夜再服。

治金瘡煩悶。止煩。白芷散方

白芷二兩　芎藭二兩　甘草二兩。炙

右三味。熬令變色。搗爲散。水調服方寸匕。日五服。夜再服。

治金瘡先有散石。煩悶欲死。大小便不通。止煩消血。解散消石散方

消石　澤瀉　白斂　芍藥　寒水石　菩蕻 已上各一兩。

右六味。搗篩爲散。水服方寸匕。日夜各一服。或未通。稍增之。

治金瘡不可忍。煩疼不得住。止痛。當歸散方

當歸　甘草 炙。　藁本　桂心　木占斯 已上各一兩。

右五味。合搗篩令調。水服半方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡弓弩所中。悶絕無所識。琥珀散方。

琥珀隨多少。搗篩。以童子小便服之。乃熱。不過三服便差。

治金瘡弓弩所中。筋急屈伸不得。敗弩散方

乾地黃 十分。　乾棗 三枚。　杜仲 二分。　當歸 四分。　附子 四分。炮。　故敗弩筋 燒灰。取五分。

右七味。合搗篩。理令勻。溫酒服方寸匕。日三服。夜一。增一至三。

治金瘡內傷。蛇銜散方

蛇銜　甘草炙　芎藭　白芷　當歸各一兩　續斷
黃芩　澤蘭　乾薑　桂心各三分　烏頭五分炮

右十一味。合擣篩。理令勻。酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡中筋骨。續斷散方

芎藭一兩半　地黃二兩　虵銜二兩　當歸一兩半　蓯蓉一兩半　乾薑三分炮　續斷三兩
附子三分炮　漢椒三分出汗去目　桂心三分　人參一兩　甘草一兩炙　細辛二分　白芷三分

藥一兩半一本用芍

右十四味。擣篩理令勻。調溫酒服之方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡煩疼。麻黃散方

麻黃六分去節　甘草五分炙　乾薑三分　附子三分炮　當歸三分
續斷三分　黃芩三分　芍藥三分　桂心三分　芎藭三分　白芷三分

右十一味。擣篩。理令勻。調溫酒。服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡煩滿。疼痛不得眠睡。白薇散方

白薇　苦蔞　枳實炒。　辛夷去毛。

甘草炙。　石膏已上各一兩。　厚朴二分。炙。　酸棗二分。炙。

右八味爲末。調溫酒。服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡去血多。虛竭。內補。當歸散方

當歸三分。　芎藭五分。　乾薑三分。　辛夷去毛。二分。　甘草三分。炙。

右五味。擣篩。理令勻。調溫酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡去血多。虛竭。內補。蓯蓉散方

蓯蓉　當歸　甘草炙。　芎藭　黃芩　桂心　人參

芍藥　乾薑　吳茱萸　白及　厚朴炙。　黃耆各一兩。　蜀椒三分。出汗。去目閉口。

右十四味。篩理令勻。調溫酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡內塞。澤蘭散方

澤蘭　防風　蜀椒去目汗閉口　石膏末　附子炮　乾薑
細辛　辛夷去毛各二兩　芎藭三分　當歸三分炒　甘草四分炙

右十一味篩理令勻調溫酒服方寸匕日三夜一膿多倍甘草渴加苦蔞二分煩加黃芩二分腹滿氣短加厚朴二分瘡中血瘀加辛夷一倍

治金瘡內塞黃耆散方

黃耆三兩　芎藭　白芷　當歸　麻黃去節　鹿茸　黃芩
細辛　乾薑　芍藥　續斷　桑蟲屎已上各一兩　附子半兩炮　山茱萸一兩

右十四味搗篩理勻調溫酒服方寸匕日三服夜一服漸可至二匕

治金瘡中芎藭解毒藍子散方

藍子五合　升麻八兩　甘草四兩炙　王不留行四兩

右四味搗篩理令勻調冷水服二方寸匕日三夜二及以方寸匕水和勻塗瘡上毒即解去矣

治金瘡大渴內補矍麥散方

瞿麥　芎藭　當歸　甘草炙.　乾薑　桂心　續斷

厚朴炙.　白斂　蜀椒去目閉.口汗.　辛夷去毛.　牡蠣末.　芎藭　桔梗

乾地黃　防風各三分.　細辛二分.　苦蔞一分.　人參三分.

右十九味.搗篩理令勻.調溫酒服方寸匕.日三夜一.或筋骨斷.更加續斷三分.

治被打腹中瘀血.蒲黃散方

蒲黃一升.　當歸二兩.　桂心二兩.

右三味.搗篩理勻.調酒服之方寸匕.日三夜一.不飲酒.熟水下.

治癰疽金瘡.續斷生肌膏方

續斷　乾地黃　細辛　當歸　芎藭　黃耆　通草

芎藭　白芷　牛膝　附子炮.　人參　甘草炙.各二兩.　臘月猪脂四升

右十四味.㕮咀.諸藥內膏中.漬半日.微火煎.三上.候白芷色黃.膏卽成.傅瘡上.日四五.膏中是猪脂煎.

治金瘡癰疽.止痛生肌.甘菊膏方

茵草　芎藭　甘草炙　防風　黃芩　大戟已上各一兩　生地黃四兩

芍藥一兩半　細辛　大黃　蜀椒去目閉口汗　杜仲　黃耆各半兩　白芷一兩

右十四味。㕮咀。以臘月猪脂四升。微火煎五上下。白芷。候黃成膏。一方添甘菊二兩。以傅瘡上。日易兩次。

治癰疽金瘡生肌膏方

大黃　芎藭　芍藥　黃耆　獨活

當歸　白芷已上各一兩　薤白二兩別方一兩　生地黃一兩別方二兩

右九味。合薤。㕮咀。以猪脂三升。煎三上下。白芷。黃膏成。絞去滓。用磨之。多少隨其意。

治金瘡腹內有瘀血。烏雞湯方

烏雌雞一隻　大黃三兩　細辛三兩　人參一兩　甘草一兩炙　地黃三兩　杏人一兩去皮雙人

盲蟲一兩　當歸二兩　芍藥一兩　黃芩一兩　桃人二兩去皮碎　大棗二十枚

右十三味。理烏雞如食法。以水二斗。煮雞。取一斗。㕮咀諸藥。內雞汁中。更煮。取三升。絞去滓。通寒溫。傷

出困甚者。初服五合。以一日二夕盡。湯便應下。食之粥。慎食他物。

治金瘡內有瘀血。未及得出。而反成膿。烏雞湯方

烏雞一隻。　白芷　麥門冬去心。　甘草炙。

芎藭　當歸已上各一兩。　桂心二兩。　瓜蔞二兩。

右八味。先理雞如食法。以水二斗。煑取七升。㕮咀諸藥。內汁中。更煑。取三升。去滓。服七合。日三。夜勿食。

治金瘡有瘀血。桃核湯方

䗪蟲三十枚。熬。　䗪蟲　水蛭各三十枚。熬。　桂心二分。　大黃五兩。　桃核五十枚。去皮切。

右六味。酒水各五升。㕮咀。合煑取三升。去滓。服一升。日三服。

治金瘡驚悸。心中滿滿如車所驚怛。狍心湯方

狍心一具。　人參　桂心　甘草炙。　乾地黃

桔梗　石膏末。　芎藭各一兩。　當歸二兩。

右九味。細切。剉。諸藥㕮咀。先以水二斗。煑心。取汁八升。內諸藥煑。取一升。一服八合。一日令盡。

治金瘡癰疽生肉膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒去目汗閉口　當歸

芎藭　薤白　芎藭　獨活　蓯蓉

白芷　丹參　黃芩　甘草已上各一兩　臘月猪脂二斤半

右十五味。㕮咀。以苦酒一升。合漬諸藥。夏一夜。冬二夜。浸以微火煎三上。候苦酒氣成膏。用之。

治被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡。搗篩。溫酒服方寸匕。日三、夜一。亦治婦人血疾。消爲水。

劉涓子鬼遺方卷第三

治強壯熱癰疽。大黃湯方

治發癰疽兼結實。淡竹葉湯方

治發背發乳癰疽。生地黃湯方

治乳癰已服前湯又淡竹葉湯方

治癰疽虛熱。生地黃湯方

治癰疽內虛熱大渴。黃耆湯方

治背生地黃湯方

治癰疽內虛。黃耆湯方

治癰疽。五味竹葉湯方

治癰疽發背乳。遠志湯方

治發背乳下復住。白石脂湯方

治發癰疽取痢。竹葉湯方

治發癰疽痢小便竹葉湯方

治發癰疽痢後小竹葉湯方

治發背癰兼味竹葉湯方

治發背已潰白石脂湯方

治發背大去膿汁黃耆湯方

治癰疽內虛生地黃湯方

治發背黃耆湯方

治炎疽枳實湯方

治腸癰大黃湯方

治背上欲有疹大黃湯方

治婦人妬乳辛夷湯方

治婦人乳結腫黃耆湯方

治癰腫熱盛黃耆湯方

治發癰疽去膿血多內補黃耆湯方

治癰疽去膿多虛滿。竹葉湯方

治癰腫增損竹葉湯方

治癰壞後。黃耆湯方

治年四十已還強壯。常大患熱癰無定處。大小便不通。大黃湯方

大黃三兩。　梔子五十個。　升麻二兩。　黃芩三兩。　芒消一兩。別方二兩。

右五味。切。以水五升煑取二升四合。去滓。下消。絞調分溫三服。快利爲度。

治發癰疽。兼結實。大小便不通。寒熱。已服五痢湯。吐出。不得下。大渴煩悶。淡竹葉湯方

淡竹葉切四升。去尖。　苦蔞四兩。　通草　前胡　升麻　茯苓

黃芩　知母　甘草炙。　石膏末。已上各二兩。　生地黃十兩。　芍藥一兩。

大黃三兩。　黃耆三兩。　當歸一兩半。　人參一兩。

右十六味。先以水一斗六升。煑竹葉。去葉。取九升。內諸藥。後煑取三升二合。分四服。日三夜一。快利便止。不必盡湯。湯盡不利。便合取利。

治發背發乳。四體有癰疽。虛熱大渴。生地黃湯方

生地黃十兩　竹葉四升　黃芩　黃耆　甘草炙

茯苓　麥門冬去心已上各三兩　升麻　前胡　知母

芍藥各二兩　苦蔞四兩　大棗二十枚去核　當歸一兩半　人參一兩

右十五味。先以水一斗五升。煮竹葉。取一斗。去葉。內諸藥。煮取三升六合。分爲四服。日三夜一。

治發背乳癰。已服生地黃湯。取利後。服此淡竹葉湯方

淡竹葉四升　麥門冬去心　黃耆　芍藥　乾地黃　生薑已上各三兩　前胡

黃芩　升麻　遠志去心　苦蔞各二兩　大棗十四枚　當歸一兩

右十三味。先以水一斗八升。煮竹葉及小麥一斗。去滓。內諸藥。再煮取三升。分溫三分。右語煮竹葉小麥。恐是麥門冬也。是小麥非也。

治癰疽虛熱。生地黃湯方

生地黃五兩　人參　甘草炙　當歸　芎藭　黃芩　通草各二兩　芍藥　茯苓各三兩　大棗二十枚　淡竹葉切成三升

右十二味。先以水二斗。煑了水。取一斗五升。去滓。復諸藥。再煑。取四升八合。一服八合。日三夜再。能頓服爲佳。

治癰疽內虛熱渴甚。黃耆湯方

生地黃八兩　竹葉切成三升　小麥二升　黃耆　黃芩　前胡　芎藭各三兩　苦蔞四兩　通草　芍藥　升麻　茯苓　甘草　知母各二兩　人參　當歸各一兩

右十六味。先以水二斗。煑竹葉及小麥。取一斗二升。去滓。復煑諸藥。取四升。分四服。日三夜一。小便利。除通草。茯苓。加麥門冬。腹滿。加石膏三兩。熱盛。去人參當歸。

治背。生地黃湯方

生地黃八兩　人參　甘草炙　芍藥各二兩　通草　茯苓

黃耆　黃芩各三兩　淡竹葉切二升　大棗二十枚　當歸　芎藭各一兩

右十二味。先以水三斗。煑竹葉。取一斗。去滓。內諸藥。再煑四升。一服八合。日三夜再。若能每服一升佳。

治癰疽內虛。黃耆湯方

黃耆　人參　甘草炙　芍藥　當歸　生薑各三兩

大棗二十枚　乾地黃　茯苓各二兩　白朮一兩　遠志一兩半

右十一味。以水一斗三升。煑取四升。去滓。分溫四服。

治癰疽。五味竹葉湯方

竹葉切二升　五味子　前胡　當歸　乾地黃

人參各二兩　小麥二升　黃耆　黃芩　麥門冬去心

生薑各三兩　甘草一兩半炙　升麻一兩　大棗十四枚　桂心半兩

右十五味。先以水二斗。煑竹葉小麥。取一斗。去滓。內諸藥。煑取三升。分溫四服。日三夜一。

治癰疽發背乳大去膿後虛惙少氣欲死服此遠志湯方

遠志去心　當歸　甘草炙　桂心　芎藭各一兩　黃耆　人參　麥門冬去心各三兩　茯苓二兩　乾地黃二兩　生薑五兩　大棗十四枚

右件十三味以東流水一斗煮取三升二合分溫四服日三夜一

治發背乳下復住服此白石脂湯方

白石脂四兩　龍骨三兩　當歸　桔梗　女萎　黃連去毛　甘草已上各二兩　白頭翁一兩　乾薑三兩

右九味以水九升煮取三升二合分四服下住便止不必盡服當下未即來日止

治發癰疽取利熱小便退不用食物竹葉湯方

淡竹葉切三升　小麥二升　乾地黃　人參　黃芩　前胡　升麻各二兩　麥門冬去心　生薑　黃耆　芍藥各三兩　大棗十四枚

桂心半兩　遠志半兩去心　當歸一兩　甘草炙

右十六味切。先以水一斗八升。煑竹葉小麥。取一斗。去滓。內諸藥。又煑。取三升。分二服。羸者分四服。日三夜一。

治癰疽取下後熱少退。小便不利。竹葉湯方

淡竹葉切一升　小麥三升　乾地黃四兩　黃耆　人參　甘草炙　芍藥　石膏末　通草　升麻　黃芩　前胡各二兩　大棗十四枚　麥門冬三兩去心

右十四味。先以水一斗六升。煑竹葉小麥。取九升。去滓。內諸藥。煑取三升二合。強。卽分三服。羸。卽四服。日三夜一。

治癰疽取利後。熱。小便不利。竹葉湯方

竹葉切三升　小麥二升　人參　黃芩　前胡　芍藥　甘草炙　乾地黃　當歸　桂心各二兩　黃耆三兩　麥門冬三兩去心　龍骨三兩碎　牡蠣一兩末　赤蛸蜘三十枚炒　大棗十四枚去核

右十六味。以水二斗。煮竹葉小麥取一斗。去滓。內諸藥。煮取四升。分四服。日三夜一。

治發背癰。及發乳。兼味竹葉湯方

淡竹葉切三升　小麥三升　黃耆　黃芩　五味子

人參　前胡　乾地黃　當歸各二兩　大棗十四枚

麥門冬二兩去心　升麻一兩　桂心半兩　甘草一兩炙　生薑三兩

右十五味。以水二斗。煮竹葉小麥。取一斗。去滓。內藥煮取三升。分溫三服。一日服。

治發背已潰。而下不住。白石脂湯方

白石脂四兩　龍骨三兩　當歸二兩　桔梗二兩

女萎　白頭翁各四兩　黃連二兩　乾薑三兩

右八味。以水九升。煮取三升三合。去滓。服八合。日三夜一。

治發背已潰。大膿汁虛惙少氣力。內補黃耆湯方

黃耆三兩　乾地黃　人參　茯苓各二兩　當歸　芎藭　芎藭

桂心　遠志去心各一兩　甘草一兩半　麥門冬去心三兩　生薑五兩　大棗十四枚

右十三味。以水一斗。煮取三升二合。去滓。分溫四服。日三夜一。

治癰疽內虛熱。生地黃湯方

生地黃五兩　人參　甘草炙　芎藭　茯苓　芎藭

通草　黃芩　當歸各二兩　大棗二十枚　竹葉切三升

右十二味。以水三斗。煮竹葉。取半。去滓。內諸藥。煮取四升。分五服。日三夜二。能服一升可佳。

治發背黃耆湯方

黃耆　黃芩　遠志　麥門冬去心各二兩　乾地黃

人參　芎藭　甘草炙　芎藭　當歸各一兩

大棗二十枚　生薑五兩　雞肶胵二具勿去皮　桑螵蛸十四枚炙

右十四味。㕮咀。以水一斗先煮。取四升五合。一服九合。日三服。夜一服。

治炎疽。枳實湯方甘林所祕不得。

枳實炙　夜干　升麻　乾地黃　黃芩

前胡各三兩　犀角一兩半　大黃二兩半　麝香半兩

右九味。㕮咀。以水九升。煮取。分溫三服須差也。

治腸癰。大黃湯。癰之爲病。診小腹腫痞堅。按之則痛。或在脅胱左右。其色或赤或白。色堅大如掌熱。小便欲調時。色色汗出時復惡寒。其脈遲堅者。未成膿也。可下之。當有血脈數。膿成不可服此方。

大黃四兩　牡丹三兩　芥子半升　消石三合　桃人五十枚去皮炒切之

右五味。㕮咀以水六升五合。分爲兩服。膿下。無者下血大良。

治背上初欲作疹。便服此。大黃湯方

大黃三兩　梔子一百枚去皮　升麻　黃芩　甘草炙各三兩

右五味。以水九升。煮取三升半。分爲三服。得快下。數行便止。不下更服。

治婦人妬乳。辛夷湯方。

辛夷一升去毛　大棗三十枚　桂長一尺　防風二分

白朮　甘草炙一尺　生薑二分　澤蘭切一升

右八味切以水一斗煑取三升分溫三服

治婦人客熱乳結腫或潰或作癰內補黃耆湯方

黃耆　茯苓各三兩　芍藥二兩　麥門冬三兩去心　甘草炙二兩

厚朴炙一兩　人參三兩　生薑四兩　乾地黃三兩

右九味切以水一斗二升煑取三升分五服日三夜一

治癰腫患熱盛黃耆湯方

黃耆　麥門冬三兩去心　黃芩六分　梔子十四枚

芍藥二兩　苦蔞二兩　乾地黃二兩　升麻一兩

右八味剉以水一斗煑取三升分溫三服

治發癰疽腫潰去膿多裏有虛熱內補黃耆湯方

黃耆二兩　茯苓　桂心　人參各二兩　麥門冬三兩去心　甘草六分炙

生薑一兩　遠志二兩去心　當歸二兩　五味子四兩　大棗二十枚

右十一味切以水一斗煮取四升分六服日四夜二

治癰去膿多虛滿上氣竹葉湯方

竹葉二切升　半夏二兩湯洗　甘草二兩炙　厚朴三兩炙　小麥四升　生薑五兩

當歸一兩　麥門冬二兩炙　人參　桂心各一兩　黃芩三兩

右十一味切以水一斗半先煮竹葉小麥取九升去滓又煮諸藥取二升分溫三服

治癰疽腫煩熱增損竹葉湯方

竹葉一握切　當歸　茯苓　人參　前胡　黃芩

桂心　芍藥各二兩　甘草三兩炙　大棗二十枚　小麥一升　麥門冬一升去心

右十二味切以水一斗六升煮竹葉小麥取一斗一升去滓內諸藥煮取三升分服日三夜重加黃耆二兩胷中惡加生薑六兩下者減芍藥黃芩各六分如體強羸者以意消息之

治癰疽後補塞去客熱黃耆湯方

黃耆　生薑　石膏末.　甘草炙.　芍藥　升麻　人參已上各二兩

知母　茯苓各一兩.　桂心六分.　麥門冬二兩.去心.　大棗十四枚.　乾地黃一兩.

右十三味.切.以水一斗二升.煮取四升.分溫四服.日三夜一.

劉涓子鬼遺方卷第四

九江黃父癰疽論
釋癰疽色診
相癰疽知是非炙法
相癰疽知有膿可破法
治癰疽腫松脂帖方
治癰疽腫松脂帖方
治癰疽松脂帖腫方
治癰疽升麻薄極冷方
治癰疽白斂薄方
治癰疽始一二痛猪膽薄方
治癰疽腫熱盛除熱黃耆湯方
治客熱鬱積在內或生瘤黃耆湯方

治癰未潰黃耆湯方
治癰內補竹葉湯方
治補度冷下赤石脂湯方
治取冷過寒下溫中湯方
治斷下補胃附子湯方
治癰及惡瘡猪蹄湯洗方
治癰腫壞多汗猪蹄湯方
治肘疽方
治癰最膿增損散方
治癰消膿木占斯散方
治發背婦人發房木占斯散方
治諸癰腫未潰矍麥散方
治瘡食惡肉散方
治癰疽食惡肉散方

治癰疽兌膏方

治食宍青龍膏方

治癰疽金瘡生肌膏方

治癰發壞出膿血黃耆膏方 缺

治熛疽侵淫瘡膏方 缺

治熛疽或如桃核雞子熛熱搗湯方 缺

治熛諸疽十指熛熱猪蹄湯方 缺

治熛疽多汁浸大粉散方 缺

治丹癰疽始發熛熱搗湯方

黃父癰疽論

九江黃父問於歧伯曰。余聞腸胃受穀。上焦出氣以溫分宍。而養骨節。通湊理。中焦出氣如露。注谿谷。而燥經脈。津液和調。變化而赤爲血。血和則乘脈先滿。乃注經絡。經絡皆盈。乃注於經絡。句有脫誤。陰陽已張。因息乃行。行有經紀。周有道理。與天合同。不得休止。切而調之。從虛去實。寫則不足。疾則氣留。去虛補實。則有餘。血氣已調。形神乃持。余已知血氣平與不平。未知癰疽之所從生。成敗之時。死生之期。期有遠近。何

以度之。可知聞乎。

歧伯曰。經脈流行不止。與天同度。與地同紀。故天宿失度。日月薄蝕也。經始紀冰道流溢。草蠹不成。五穀不植。經路不通。民不往來。菴聚邑居。別離異處。血氣猶然。則言其故。

夫血脈榮衞。周流不休。上應星宿。下應經數。寒客於經絡之中。則血泣。泣則不通。不通則歸之不得復及。故癰腫與寒氣化爲熱。熱勝則肉腐。肉腐則爲膿。膿不寫。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則水髓消。不當骨肉。不寫。筋枯空虛。筋骨肌肉不得相親。經脈敗漏。薰於五藏。五藏傷。故死矣。

黃父曰。願聞於癰疽之形。與其期日。

歧伯曰。略說癰疽極者。一十八種。癰發於嗌。名曰猛疽。猛疽不治。則化爲膿。膿塞其咽。半日死。其爲者寫則已。含豕膏無冷寫。三日而已。一方無冷食。發於頸者。名曰天疽。其狀癰大而赤黑。不急則熱氣下入淵脈。腋前。傷任脈。內薰肝脈。十餘日死。陽氣大發消腦。名曰腦漏。其色不樂。項痛如刺。以藏頭乘心者不治。本作留字。發於肩及臑者。名曰雌癰。其狀赤黑。急治之。此令人汁出。至足不害五藏。

發於腋下赤堅者。名曰米疽。治之砒石。欲細長疏。或云塗豕六膏。日以勿裹。其疽堅而不潰者。馬刀夾纓。乃治之。

發於胷者。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。下入腹。不治。十日死。

發於臆者。名曰甘疳。其狀如穀實萎苽。常寒熱。急治之去其寒。十歲似誤死。死後膿自出。

發於脅者名曰改訾。改訾者女子之病也。久之其疾大癰膿。治之其中乃有生肉。大如赤小豆。剉陵翹草。陵根。各一升。水六升。煑之竭。爲三升。卽強飲。厚衣坐釜上。令汗出至足已。

發於股陽明。名曰股瓮疽。其狀不甚變。而癰膿附骨。不急治。四十日死。

發於股陰。名曰赤施疽。不急治。六日死。在兩股之內。不治六日死。一方云。十六日死。發於尻名曰兌疽。其狀赤堅大。急急治之。不速治。三十日死。

發於膝。名曰雌疽。其狀癰色不寒熱而堅。勿破。破之死。須以手緩柔之。乃破。

諸疽發於節。而相應之者。不可治之也。

發於陽者。百日死。

發於陰者。四十日死。

發於腦。名曰蒐齧。其狀疾赤至胃。急治之。不治煞人。

發於踝。名曰走泬。其狀癰也。急不變。灸而止其寒熱。不死。

發於足上。名曰四淫。其狀如癰。不急治之。百日死。

發於足。名曰厲疽。其狀初小指發。急治之。去其黑者。不輒益。不治百日死。

發於足指。名曰脫疽。其狀赤黑不死。治之不衰。急漸去之。治不去。必死矣。

夫癰疽者。初發始微。多不爲急。此實奇患。惟宜速治之。急治不苦速。成病難救。以此致禍。能不痛哉。具述所懷以悟後賢。謹按黃父癰疽論。所著緩急之處。生死之期。如有別癰之形色。難易之治。如左僧納私撰。是用非是先賢。恐後高雅。故記之名字。令惑之耳。

發皮宍淺。腫高之。赤卽消。不治亦愈。

發筋宍深。腫下之堅。其色或青或黃白黑。或復微熱而赤。宜急治之。成消中半。發附骨者。或未覺肉宍。肉宍已殃者。癰疽之甚也。肉宍肉宍似誤。按宍卽肉字也。

凡發背外。皮薄爲癰。皮堅爲疽。如此者多現先兆。宜急治之。皮堅甚大者。多致禍矣。

夫癰壞後有惡宍當者。以猪蹄湯洗其穢。次傅食宍膏散。惡宍盡。乃傅生肌膏散。乃摩四邊。令善宍速生。當須絕房室。愼風冷。勿自勞動。須筋脈復常。乃可自勞耳。不爾。新宍易傷。則重發。便益潰爛。愼之愼之。

相癰疽知是非可灸法

癰疽之甚。未發之兆。肥渴爲始。始發之始。或發日疽鼂。似若小癤。或復大痛。皆是徵候。宜善察之。欲知是

非重按其處。是便隱復按四邊。比方得失。審定之後。卽灸。第一。便灸其上二三百壯。又灸四邊一二百炷。小者灸四邊。中者灸六處。大者灸八處。壯數處所。不患多也。亦應卽怗卽薄。令得所卽消。內服補暖湯散。不已。服冷藥。外卽冷薄。不已。用熱怗。怗之法。開其口泄熱氣。

相癰知有膿可以破未

癰大堅者未有膿。半堅薄。半有膿。當上薄者。都有膿。便可破之。所破之法應在下逆上破之。令膿得易出。用排針。膿深難見。上宍厚而生宍。火針。若外不別有膿。可當其上。數按之。內便隱痛者。宍殃。堅者未有膿也。按更痛於前者。內膿已熟也。膿泄去熱氣。不爾長速。速卽不良。

治癰疽腫。松脂怗方。

黃蘗　芎藭　白芷　白斂　黃耆
黃芩　防風　芍藥　茵草　白蠟
當歸　大黃各一兩　細辛二分　膃脂三兩　松脂二斤

右十六味。切曝乾極燥。微火煎三上。下手不得離。布綿絞去滓。怗之。

治癰疽腫松脂怗方

當歸　黃耆　黃連　芍藥　黃芩

大黃　臘蜜　芎藭各一兩　松脂一斤半陳　膃脂一合半

右十味。細切合煎。微火三上下。膏成。綿布絞去滓。向火塗紙上貼之。

治癰疽松脂貼腫方

松脂一斤　大黃三分　膃脂一兩　細辛半分　黃芩一分半

防風半分　白芷　白斂　芎藭　當歸

芍藥　茵草　黃連　白蠟　黃蘗各一分

右一十五味。細切曝令極燥。先煎脂蠟。下松脂洋盡。內諸藥二上下。候色足。絞以綿布。水中以新竹片上火炙之。施紙上貼之。此藥大祕。實有奇效。不妄傳之。

治癰疽升麻薄極冷方

升麻一兩　大黃一兩　白斂六分　黃耆一兩　黃芩六分

白及一分乾者　牡蠣二分粉　龍骨一兩　甘草二分炙　芎藭一兩

右十味。篩和。以猪膽調塗布傅之癰上。燥。易之。

治癰白斂薄方

白斂　大黃　黃芩各等分

右三味。擣篩。和雞子白。塗布上。薄癰上二。燥輒易之。亦可治。又以三指撮。置三升水中。煑三沸。綿注汁。拭腫上數十過。以寒水石沫。塗腫上。紙覆之。燥復易。一易。輒以煑汁拭之。晝夜二十易之。

治癰疽始一二日。痛微。內薄令消。猪膽薄方

黃耆　龍骨　青木香　梔子人　羚羊角　乾地黃

升麻　白斂　大黃　黃蘗　黃芩　芎藭

赤小豆　麻黃去節　黃連　犀角一兩

右十六味。各等分。擣篩。以猪膽調令如泥。以故布開口。如小豆大。以泄熱氣。

治癰腫。熱盛口燥患渴。除熱止渴。黃耆湯方

黃耆　苦蔞　乾地黃　升麻各二兩

麥門冬三兩去心　梔子三十枚　芍藥三兩　黃芩一兩半

右八味以水一斗煮取三升分溫三服

治客熱鬱積在內或生癤黃耆湯方

黃耆二兩　人參一兩　芎藭　當歸　甘草炙各一兩　麥門冬去心五兩　遠志去心　乾地黃各二兩　大棗二十枚　生薑五兩

右十味切以水一斗二升煮取三升分溫三服

治癰未潰黃耆湯方

黃耆四兩　甘草二兩炙　桂心三兩　芍藥　半夏　生薑各八兩　飴一斤

右七味以水七升煮取三升飴化分三服

治癰內補竹葉黃耆湯方

竹葉切一升　黃耆四兩　甘草二兩　芍藥四兩　黃芩一兩　人參二兩　茯苓　生薑各一兩

桂心一兩如冷用半兩　大棗十二枚　乾地黃二兩　升麻三兩

右十二味。以水二斗。煮竹葉。澄清。取九升。內諸藥。更煮取三升。分溫三服。

治補度冷下赤石脂湯方

赤石脂　人參　甘草炙。　乾薑各二兩。　龍骨一兩。碎。　附子大者一枚。炮。

右六味。切。以水八升。煮。取二升半。去滓。分溫三服。如人行十里。進一服。

治取冷過寒下飴見出溫中湯方

甘草六分。炙。　乾薑六分。　附子炮。去皮。破六分。　蜀椒二百四十粒。去口者出汗。

右四味切。以水六升。煮。取二升。分溫三服。

治斷下補胃附子湯方

附子二分。炮。　當歸　人參　黃連　甘草炙。各一兩。

乾薑　桂心　芍藥各二分。　蜀椒去汗目閉口半分。

右九味。以水五升。煮取一升五合。去滓分溫二服。

治癰瘡及惡瘡。有惡宍。猪蹄湯洗方

猪蹄一具治如食法　白斂二兩　白芷二兩　黃連一兩　狼牙二兩　芎藭二兩　黃芩　獨活　大黃各一兩

右九味。以水三斗。煮猪蹄。一斗五升。去蹄。內諸藥。又煮。取五升。洗瘡。日四次。甚良。

治癰疽腫壞多汁。猪蹄湯方

猪蹄一具治如食法　芎藭　甘草炙　大黃　黃芩各二兩　芎藭三兩　當歸兩

右七味。先以水一斗五升。煮蹄。取八升。去蹄。內諸藥。更煮取三升。更去滓及溫。洗瘡上。日三。亦可以布內湯中。薄瘡腫上。燥復之。

治肘疽方

黃連　皂莢各等分炙去皮子

右二味。擣下。和以淳苦酒。調令如泥。塗滿肘。以綿厚薄之。日三易。良。

治癰疽最膿增損散方

黃耆五分膿多倍之　小豆一分熱口乾倍之　芎藭二分肉未生倍之　白斂三分有膿瘡不合倍之　苦蔞三分若小便利倍之

右六味。擣篩。令細。酒調。溫服方寸匕。日三。

治癰消膿。木占斯散方

木占斯　桂心　人參　細辛　敗醬

乾薑　厚朴　甘草炙。　防風　桔梗　已上各一兩。

右十味。擣篩酒服方寸匕。入咽。覺流入瘡中。若癰及疽亦之不能發。壞者可服之。瘡未壞。去敗醬。已發膿。內入敗醬。此藥時有化癰疽成水者。方正桂爲異。故兩存焉。案正桂句似誤

治發背及婦人發房。幷腸癰。木占斯散方

木占斯　厚朴炙。　甘草炙。　細辛　苦蔞

防風　乾薑　人參　桔梗　敗醬　已上各一兩。

右十味。擣篩。清酒服方寸匕。日七夜四。以多爲善。敗醬。草名也。病在上者當吐。在下者當下膿血。此謂腸癰之屬也。諸病在裏。惟服此藥。卽覺有力。及癰疽便卽復痛。長服治諸瘡及疽。痔瘡已潰。便卽早愈。凡俗流醫。不知用此藥發背。有不善而渴。便勸服之。若藥力行。覺渴。心便消散。若雖服壞。終無苦。但晝夜服勿懈也。發此藥消散。不覺腫去時卽愈。或長服。卽去敗醬。偏治婦人乳腫。諸產疵。速愈。良。又云惟

服有異。始覺背有不善之也。

治諸癰疽已潰未潰。瘡中疼痛。膿血不絕。矍麥散方

矍麥　白芷　黃耆　當歸　細辛

芎藭　薏苡人　芎藭　赤小豆末各一兩

右九味。先以清酒小豆出於銅器中。熬令乾。復漬。漬後復熬。五過止。然後治末。合搗篩。溫酒服方寸匕。晝夜各五。三日後痛痒者。肌肉也。又方。用苦酒漬小豆。多痛。倍矍麥。瘡口未開。倍白芷。多膿。倍黃耆。薏苡人。芎藭等。

治癰食惡宍散方

藜蘆一分半　眞珠一分半　石硫黃　雄黃　麝香各三分

馬齒　礬石熬　漆頭　蘆茹各三分

右九味。篩搗粉瘡上。亦可爲膏和傅瘡上。

治癰疽食惡宍散方

雄黃一兩。　礬石一分。熬。　蘆茹一兩。

右三味。搗篩。稍著之。隨用多少。不限一兩。

治癰疽兌膏方

當歸　芎藭　白芷　松脂各二兩。　烏頭一兩。　猪脂二升。　巴豆十枚。去心皮。

右七味。㕮咀。內膏中。微火合煎三沸已。內松脂。攪合相得。以綿布絞之。去滓。以膏著綿絮兌頭丈作兌。兌之瘡雖深淺。兌之膿就兌盡。卽善肉。瘡淺者不足。兌著瘡中。日三。惡肉盡則上。

治食宍靑龍膏方

白礬二兩。火煉末之。　熟梅二升。去核。　鹽三合。　大鍰二十七枚。

右四味。於銅器中猛火投之。摩滅成末。乃和猪脂。搗一千杵。以塗瘡上。甚痛勿怪。此膏食惡宍盡。復著。可傅蛇銜膏塗之。令善宍復生。

治癰疽金瘡生肉膏方

大黃　芎藭　黃耆　獨活　白芷

芎藭各一兩　當歸一兩　薤白二兩　生地黃三兩

右九味。㕮咀。以盛煎猪膏三升。煎三上下。以綿布絞去滓。用兌摩。多少隨意常用之。

治丹癰疽始發。焮熱。浸淫。長成搔湯方

升麻　黃芩各三兩　黃連　大黃各二兩　當歸一兩

甘草一兩炙　芎藭二兩　芒消三兩　羚羊角屑各一兩

右九味。㕮咀。以水一斗三升。煑取五升。絞去滓。鐺中內芒消。上火。攪令成。沸盡。滓稍分。適冷熱。貼帛搨腫上。數過其熱隨手消散。王練甘林所祕。不傳此方。

劉涓子鬼遺方卷第五

治癰疽敗壞生地黃膏方
治癰疽瘡生肌黃耆膏方
治發背乳急痛丹參膏方
治癰疽腫痛堅強不消黃芩膏方
治癰疽止痛鷗脂膏方
治癰疽金瘡續斷膏方
治癰疽金瘡止痛甜竹葉膏方
治癰疽敗壞生肉茵草膏方
治癰疽敗壞膿爛蛇銜膏方
治癰疽食肉膏方
治癰疽食肉大黃膏方
治癰疽食惡肉蘆茹膏方

治癰疽始作便敗壞膏方
治久病疥癬膏方
治瘑疽惡疥癬五黃膏方
治瘑疥癬散熱水銀膏方
治面黯皰麝香膏方
治面瘡皰木蘭皮膏方
治瘡皰鸕鷀屎膏方
治髮頹生髮膏方
治婦人乳腫丹參膏方
治頭白頹經年五味子膏方
治疽漏瘑疥惡瘡膏方
治久瘑疽諸瘡野葛膏方
治丹砂膏三首
赤膏治百病方

治熛疽丹砂膏方

治熛疽麝香膏方

治釘腫芎藭膏方

治熛疽始發丹砂膏方

治風溫病疽諸惡瘡膏方

治瘡疥諸惡瘡丹砂膏方

治小兒頭瘡紫草膏方

治小兒熱瘡水銀膏方

治火瘡相皮膏方

治熛疽浸淫廣大羊髓膏方

治熱毒瘡升麻膏方

治熱瘡生地黃膏方

治諸瘡爛雄黃膏方

治瘡疥疽漏水銀膏方

治痱瘰癧瘡白芷膏方
治皮膏中熱痱瘰白斂膏方
治熱瘡生地黃膏方
治溫熱諸瘡黃連膏方
治熱瘡蛇床子膏方
治熱瘡木蘭膏方
治熱瘡黃連膏方
治炙瘡甘草膏方
治諸癰破大去膿黃耆膏方
治癰疽已潰白芷摩膏方
治諸疽瘡膏方
治鼻中塞白芷膏方
治竹本所刺手腳羊屎膏方
治湯淚人肉爛壞朮膏方

治火燒爛壞栢皮膏方

治久病瘡疽惡瘡蘆茹膏方

治婦人妬乳生瘡雄黃膏方

治惡瘡麝香膏方

治頭瘡骨疽牛屎薰方

治諸傷六物滅瘢膏方

治癰疽敗壞生肉地黃膏方

生地黃一斤　辛夷　獨活　當歸　大黃　芎藭

黃耆　薤白　白芷　芍藥　黃芩　續斷各二兩

右十二味切以臘月猪脂四升微火煎白芷色黃膏成絞去滓傅日四

治癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒去目閉口汗　當歸　芎藭　薤白

白芷　丹參　甘草炙　蓯蓉　獨活　黃芩已上各一兩　臘月猪脂一斤半

右十四味。細切。以苦酒一升二合。夏卽漬一日。冬二夜。微火煎三上下。酒氣盡。成膏。傅之。極良。

治發背乳口已合皮止急痛生肉膏方

丹參　防風　白芷　細辛　芎藭　黃芩　芍藥

甘草炙　黃耆　牛膝　槐子　獨活　當歸

右十三味。切。以臘月脂五升。微火煎三上下。白芷黃膏成。病上摩。向火。日三四。

治癰腫堅強不消。不可用傅貼處。黃芩膏方

黃耆　黃芩　芎藭　白斂　防風　茵草

白芷　芍藥　大黃　細辛　當歸已上各一兩

右十一味。㕮咀。以猪脂四升。微火上煎。一沸一下。白芷黃。卽成膏。傅之。堅硬者。日可十易。

治癰疽止痛生肌鷗脂膏方

松脂七兩　芍藥　當歸　芎藭　黃芩各一兩　鷗脂七兩　白蠟五兩

右七味。㕮咀。以臘月猪脂二升二合。微火煎一沸一下。三十過成。以摩於瘡上。

治癰疽金瘡續斷生肉膏方

續斷　乾地黃　細辛　當歸　芎藭　黃耆　通草

芍藥　白芷　牛膝　附子炮製　人參　甘草炙各二兩　臘月猪脂四升

右十四味。㕮咀。著銅器中。下膏。諸藥漬之半日。微火煎三上。下。白芷候黃。膏成。傅之瘡上。日四五過。良。

治癰疽瘡止痛生肉甜竹葉膏方

甜竹葉五兩　生地黃四兩　大戟二兩　臘月脂四升　當歸　續斷

白芷　茵草　芎藭　防風各二兩　甘草一兩半炙　芍藥一兩半

蜀椒半兩去目汗閉口　細辛　大黃　杜仲各半兩　黃耆半兩

右十七味。㕮咀。以猪脂微火煎五上下。候白芷黃。膏成。傅瘡上。甚良。

治癰疽敗壞生肉茵草膏方

茵草　當歸　薤白　黃芩　甘草炙各二兩

生地黃五兩　白芷三兩　大黃四兩　續斷一兩

右九味。㕮咀。以猪脂三升。微火煎三沸。三上下。白芷黃膏成。傅瘡良。

治癰疽膿爛并小兒頭瘡。牛領馬鞍革。及腸中諸惡耳聾痛風。腫腳疼。金木水火毒螫所中。衆瘡百疹。無所不治。蛇銜膏方

蛇銜　大戟　大黃　芍藥　附子炮　當歸　獨活
茵草　黃芩　細辛　芎藭　蜀椒去目閉口汗　薤白已上各一兩

右十三味。㕮咀。以苦酒漬之。淹一夜。以猪脂二升半。微火煎三上下。膏成。綿布絞去滓。病在內。酒下彈元大。

治癰疽食宍膏方

松脂五兩　雄黃別研　雌黃　野葛皮各二兩　猪脂一斤　漆頭蘆茹三兩　巴豆一百枚去皮膜心

右七味。先煎松脂。水氣盡。下諸藥。微火煎三上下。膏成。絞去滓。內雄雌二黃。攪調。以膏著兌頭內。瘡內口。方六七勿字兼新故。初用病更腫赤。但用如節度。惡宍盡止。勿使過也。

治癰疽大黃食宍膏方

大黃　附子　茵草　芎藭　雄黃　眞珠末各一兩

白斂　礬石　黃芩　漆頭蘆茹各二兩　雌黃一兩

右十一味。㕮咀。六物。以猪脂一升四合。微火煎三上下。末蘆茹下。煎成膏中。以塗兌頭。傅瘡中。須惡肉盡。勿使過也。

治癰疽食惡肉蘆茹散方

漆頭蘆茹　礬石　硫黃　雄黃已上各二分

右四味。搗篩。攪令著兌頭內瘡口中。惡肉盡止。勿使過也。

治癰疽始作便敗壞發瘡膏方

羊髓一兩　甘草二兩　胡粉五分　大黃一兩　猪脂二升

右五味。切。合脂髓。煎。二物令洋。內甘草大黃三上下。去滓。內胡粉。攪令極調。傅瘡上。日四五。

治久病疥癬惡瘡膏方

丹砂　雄黃　雌黃　亂髮洗　松脂

白蜜已上各一兩　蘆茹漆頭者三兩　巴豆十四個去皮心　臘月猪脂三升

右九味。先煎亂髮。消盡。內松脂。煎三上下。成膏。絞去滓。末茹。內膏中。煎。攪極調。傅瘡上。日三易之。

治久病疥癬諸惡瘡毒。五黃膏方

雌黃　雄黃　黃連　黃蘗　黃芩

青木香　白芷各二兩。　亂髮一團。雞子大。　雞舌香一兩。　狼跋子四十枚。

右十味。㕮咀。以苦酒半升漬諸藥。一夜。以臘月脂三升。先煎髮一沸。內諸藥。三五沸止。絞去滓。成膏。傅瘡上。日五易之。

治病疥癬惡瘡。散熱水銀膏方

水銀　礬石　蛇床子　黃連已上各一兩。

右四物。兩度篩。以臘月猪脂七合和。幷水銀。攪令調打數萬過。不見銀。膏成。傅瘡。若膏少。益取。幷小兒瘡。良。蘆茹一兩。　蘗慶宣加

治面黟皰。麝香膏方

麝香二兩。　當歸　附子　芎藭

白芷　芎藭　已上各一兩　細辛　二合　杜衡　二分

右八味。㕮咀。以臘月猪脂一升二合。煎諸藥三上下。絞去滓。別末。研麝香。安膏中。攪令調。傅皰上。日三易之。

治面查皰。木蘭膏方

木蘭　防風　白芷　青木香　牛膝

獨活　藁本　當歸　芎藭　杜衡

辛夷　芎藭　細辛　各一兩　麝香　一分　附子　二分炮

右十五味。㕮咀。諸藥。以臘月猪脂一升。微火煎三沸。三上下。去滓。末下。攪令調。膏成。傅皰上。日三。

治查皰。鷓鴣屎膏方

右取鷓鴣屎一升。搗篩。臘月猪脂調和。傅之。

治頭頹生髮。白芷膏方

白芷　蔓荊子　附子　防風　芎藭　茵草

細辛　黃芩　當歸　蜀椒　各一兩去汗閉口　大黃　一兩半　馬鬐膏五合　此所用多無

右十二味。切。以臘月猪脂三升。合諸藥。微火煎三上下。白芷色黄。膏成。洗頭澤髮。勿近面。

治婦人乳腫痛。丹參膏方

丹參　芍藥各二兩　白芷一兩

右三味。以苦酒漬一夜。猪脂六合。微火煎三上下。膏成傅之。

治頭白頽瘡髮落。生白痂。經年不差。五味子膏方

五味子二分　兎絲子五分　蓯蓉二分　雄黄一分　松脂二分

虵床子　遠志去心各三分　雌黄　白蜜各一分　雞屎半分

右十味。以猪膏一升二合煎。先内雌黄。次内雞屎。次内蜜。次内松脂。次内諸藥。並先各自末之。膏成。先以桑灰洗頭後傅之。

治疽瘻瘑疥諸惡瘡。連年不差。并小兒頭瘡。悉治之。膏方

黎蘆　附子　蘆茹　桂心　天雄　虵床子　野葛皮

雄黄　亂髮洗　白芷　半夏洗湯　礬石　細辛　杏人

芎藭　芍藥　白朮　烏頭各二兩　黃連　當歸　藁本已上各二兩

班猫　茵草　巴豆去皮心　黃蘗　吳茱萸　蜀椒各一兩去目閉口汗

右二十七味。㕮咀。以苦酒漬一夜。以臘月猪脂四斤。微火煎。令酒氣盡。膏成。日四五傅。用多妙。

治久瘑疽諸瘡。治葛膏方

治葛皮　黃連　細辛　杏人　茵草　芍藥　黎蘆

附子　亂髮　蘆茹　芎藭　白芷　虵床子　桂心

藁本　烏頭　白朮　吳茱萸　雌黃　礬石　天雄

當歸已上各二兩　班猫　巴豆去皮心　蜀椒去目汗閉口　黃蘗各一兩

右二十六味。㕮咀。各擣篩。以猪脂五升。於銅器內。微火煎諸藥七沸上下。絞去滓。更煎。攪勻。成膏。以傅瘡上。日四五。

丹砂膏方三首

丹砂五兩　芎藭三兩　大黃二兩　蜀椒二兩去目出汗　白芷二兩　麝香三兩　升麻二兩

冶葛皮二兩　麻黃五兩去節　丹參五兩　巴豆二升去皮心　桂心二兩　附子十二枚　皂莢二兩去皮子

右十四味以猪脂六升春夏共用調合在後方消停

又方

丹砂三兩　芎藭三兩　大黃二兩　蜀椒去目汗二兩　白芷二兩　麝香六兩　朮二兩　附子十二枚　乾薑五分　冶葛二兩　丹參六兩　細辛二兩　巴豆三升去皮心

右十三味秋冬共用亦在年中有所宜以意消息藥各擣羅之巴豆細切以苦酒漬一夜量足不須覆之明旦以猪脂成六升鐺中微火煎三上下膏成勿使傍人及雞犬猫見其膏同治共敍此方須是細意事持

又方

丹砂二兩末　蜀椒去目閉口汗　大黃　白芷　甘草炙已上各二兩　巴豆三升去皮心　麝香　芎藭各二兩　附子二枚　升麻二兩　冶葛皮　犀角　當歸　烏頭各二兩　丹參一斤

右十五味。切。以苦酒漬之。一夜。以猪脂六升。微火煎三上下。膏成。絞去滓。用之。此膏是四時常用。日三。此方無比。

丹砂膏。敍治百病。傷寒溫毒熱疾。服如棗核大一枚。鼻塞。取半核大。內鼻中。縮氣。令人聰裏。若耳聾。取如兩棗核大。洋之。如水。內其耳中。三五年聾可差。或寒癖腹滿堅脹。及飛尸惡毒楚痛。溫酒服。霍亂當成未成。已吐未痢。白湯服棗核大。若已痢。一兩行。而腹煩痛。更服之。眼中風膜膜或痛。常下泪。取如粟大。注眼中。自當下。止。或半目痛。便愈。

又胸背喉頸痛。摩足口中亦稍稍令常聞有膏氣。人體自有不同者。易爲藥。當服取利爲度。老小增減。服膏之法。得利若不利。如人行十五里。可與熱飲發。當預作白薄粥令冷。若過利要止者。多進冷粥。便住。若能忍待藥勢盡。自止。更佳。

赤膏。治百病方 治痢同丹砂膏用之。

冶葛皮一兩。 白芷一兩。 蜀椒二升去目閉口汗。 大黃 芎藭各二兩。

巴豆三升去皮心。 附子十二枚。 丹參一斤。 猪脂六升。

右九味。㕮咀。以苦酒漬一宿。合。微火煎三上下。白芷黃。卽膏成。絞去滓。用傷寒鼽鼻。溫酒服如棗核大

一枚。

賊風癰疽腫。身體惡氣。久溫瘧。骨節疼痛。向火摩之。　瘡疥諸惡瘡。以帛薄之。　鼠瘻疽痔下血。身體隱軫。痒搔成瘡。汁出。馬鞍牛領。以藥傅之即愈。　腰背手足流腫。拘急屈申不快。以膏傅之。日三。婦人產乳中風。及難產。服如棗核大。并以膏摩腹立生。　如食魚哽。日五服愈。　如耳聾。以膏如小豆大。著耳中。患息肉。以膏內鼻中愈。　眼齒痛。以膏如粟注背中白蘆醫當童子視以膏如粟注背愈。

治慓疽。丹砂膏方

丹砂末。　犀角　夜干　大黃　芎藭　麝香末。

黃芩各二兩。　生地黃十兩。切。　升麻　前胡　沈香各三兩。　青木香一兩。

右十二味。㕮咀。以苦酒漬淹一宿。以猪脂五升。微火煎三上下。絞去滓。內丹參麝香末。攪調。稍稍服之。

治慓疽。麝香膏方

麝香末。　凝水石　黃芩　丹砂末。　芎藭　雞舌香　青木香各二兩。

茵草三兩。　升麻三升。　羚羊角　夜干　大黃　羊脂各三兩。　地黃汁一升。

右十四味。切。以苦酒漬一夜。用猪脂六升。微火上煎三上下。絞去滓。內麝香丹砂末。攪令調。膏成。以摩

病上甚良。

治丁腫生芎藭膏方

生芎藭汁一升。丹砂二兩。生地黃二斤。白芷三兩。大黃三兩。麝香末三兩。甘草三兩炙。當歸二兩。升麻二兩。薤白八兩。

右十味。㕮咀。以苦酒漬一夜。猪脂五升。微火煎三上下。膏成。摩於腫上。

治熛疽。始發未曾治。宜速服。丹砂膏方

丹砂末。犀角二兩。夜干三兩。生地黃十兩。大黃三兩。升麻三兩。芎藭三兩。麝香二兩。前胡三兩。沈香二兩。黃芩三兩。青木香一兩。

右十二味。㕮咀。以猪脂五升。微火煎三上下。止。絞去滓。入麝香丹砂末。攪令調。溫酒下。如棗核大。日三服。

治風溫癌疽諸惡瘡。經年不差。其著胸臆背日大不可視之。恐見肺肺髓者。皆主之。傳當火須以意用之。

丹砂膏方

丹砂末　雄黃末　附子　天雄　乾地黃　大黃
當歸　秦膠各二兩　烏頭　桂心　黃連　松脂
茴芋各四兩　蜀椒一升去目汗　乾薑二兩　巴豆一百枚去皮心　蜈蚣四枚去頭足赤者　石南草二兩

右十八味。㕮咀。十六味。以苦酒一斗。漬一夜。以猪脂六升。微火煎三上下。藥色膏成。絞去滓。內二石末。攪令調。傅瘡有口。亦可兌。瘡口。此脂多治合卽隨多少。苦酒不必盡一斗。以意量用之。

治瘑疥癬諸惡瘡。丹砂膏方

蜀椒三升去目汗　丹砂　細辛　桂心各二兩　附子三十枚　前胡
白芷各切一升　芎藭切　白朮　吳茱萸各一升　當歸一兩

右十一味。㕮咀。諸藥唯椒茱萸不搗。以苦酒漬一夜。令淹。以猪脂不中水者。十斤。細切。合諸藥於銅器內。煎三上下。白芷黃。成膏。以綿布絞去滓。如患風溫腫不消。服如彈丸大一枚。若鼻塞不通。以膏著鼻中。若青盲風目爛眥。痒痛。茫茫不見細物。以綿絮裹筯頭。注膏中。以傅兩眥。至臥時再傅之。齒痛亦如耳聾。亦准之。諸惡痛皆治之。金瘡牛領馬鞍瘡。亦可傅之。治下赤。腹中有癰。

并瘻疾在外。卽摩之。在內卽服之。如彈丸大一枚。日三服。此膏無所不治。

治小兒頭瘡。并惡紫草膏方

紫草三兩。黃連　女青　白芷各一兩。礬石三兩。燒令汗出。苦酒五合。生地榆根一兩。

右七味。內三味。礬石紫草黃連爲末。入諸藥煎。白芷黃。膏成。傅瘡上。

治小兒熱瘡。水銀膏方

水銀二兩。胡粉二兩。松脂二兩。猪脂四升。

右四味。煎松脂水銀氣出。下三物。攪令不見銀。放冷。以傅瘡上。

治火瘡。相皮膏方

右皮去黑皮。用白肉。以猪脂少多。煎去滓。候凝。隨意使之。

治熛疽。浸淫廣大。赤黑爛壞成瘡。羊髓膏方

羊髓二兩。大黃二兩。甘草一兩。胡粉二分。

右四味。㕮咀。以猪脂二升半。并胡粉。微火煎三上下。絞去滓。候冷。傅瘡上。日四五。

治熱毒。并結。及腫。成瘡。升麻膏方

升麻三兩　白朮一兩　牡蠣三分　白芨二兩　白斂二兩

茵草二分　夜干二兩　大黃二兩　黃連二兩

右九味。㕮咀。以猪脂三升。微火煎。膏成。絞去滓。以傅瘡上。日四五。

治熱瘡。生地黃膏方

生地黃　白斂　白芷　黃連　升麻　黃芩　大黃已上各十兩

右七味。㕮咀。以猪脂一升半。微火煎成膏。絞去滓。傅瘡。日四五。

治惡瘡皆爛。雄黃膏方

雄黃　礬石末　黎蘆　當歸　黃連

附子各二兩　茵草　芎藭　白芨各一兩　巴豆六十枚去皮心

右十味。㕮咀。以猪脂二升。微火煎。膏成。絞去滓。內石末。攪調。傅瘡。日四五。

治癘疽瘻。水銀膏方

水銀二兩半　胡粉二兩　松脂二兩　猪脂四升

右四味。先煎松脂。水氣盡。下胡粉。攪令水銀盡不見。可傅瘡。日三。亦治小兒疳熱瘡。頭瘡。

治痱瘰癧瘡。白斂膏方

白斂三兩　白芷三兩　芎藭　大黃　黃連各二兩

當歸三兩　黃蘗二兩　豉八合炒　羊脂三兩　猪脂二升

右十味。㕮咀。以二脂合煎。內諸藥。微火煎。膏成。去滓。候凝。傅之。

治皮膚中熱痱瘰癧。白斂膏方

白斂　黃連各二兩　生胡粉一兩

右三味。搗篩。溶脂。調和傅之。

治熱瘡。生地黃膏方

生地黃四兩　黃連四兩　大黃三兩　黃蘗　甘草炙　白斂　升麻各二兩

右七味。㕮咀。以猪脂二升半。微火合煎。膏成。絞去滓。候凝。可傅之。

治熱瘡。生地黃膏方

生地黃四兩　黃連五兩　白斂　芍藥　白芨各二兩　苦參　升麻各三兩

右七味。㕮咀。以猪脂二升半。內諸藥。同熬。膏成。去滓。候凝。傅之。

治溫熱諸瘡。黃連膏方。

黃連　白斂　白芷各二兩　生胡粉一兩

右四味。細篩。用猪脂調塗之。

治熱瘡。虵床子膏方

虵床子二兩　乾地黃二兩　苦參一兩　大黃二兩

通草二分　白芷　黃連各一兩　狼牙二分

右八味。搗篩爲細末。用猪脂。以意調和塗之。

治熱瘡。木蘭膏方

木蘭一兩　白芷　黃連各三兩　黃蘗二兩　芍藥一兩

梔子二十一枚　黃芩二兩　狼牙二兩　夜干一兩　虵床子一兩

右十味。㕮咀。以猪脂二升。合諸藥。微火煎。膏成。去滓。塗傅之。

治熱瘡。黃連膏方

黃連　生胡粉各三兩。白斂二兩。大黃二兩。黃蘗二兩。

右五味爲末。用猪脂。以意調和塗之。

治灸瘡。甘草膏方

甘草一兩。當歸一兩。胡粉半兩。羊脂一兩半。猪脂三兩。

右五味。㕮咀。以猪羊脂。幷諸藥。微火煎成膏。絞去滓。候凝。傅之。

治諸癰破後。大膿血極虛。黃耆膏方

黃耆　附子　白芷　甘草　防風　大黃　當歸　續斷　芍藥各一兩。蓯蓉一分。生地黃五分。細辛三分

右十二味。切。以猪脂三升。內諸藥。微火慢煎。候白芷黃色。膏成。絞去滓。候凝。塗瘡。摩四邊。口中。日四過。

治癰疽已潰。白芷摩膏方

白芷三分　甘草三分　烏頭三分　薤白十五枚　青竹皮如雞子大一塊

右五味。以猪脂一升。合煎。候白芷黄膏成。絞去滓。塗四邊。

治諸疽瘡膏方

蠟一兩　亂髮　礬石熬各一兩　松脂一兩揀　猪脂四兩

右五味。先下脂。煎令消。下髮。髮消。下礬石。礬石消。下松脂。松脂消。下蠟。蠟消。膏成。濾過。候凝。塗傅之。

治鼻中塞利鼻。白芷膏方

白芷　通草　棗核各一分　薰草二銖　羊髓八銖　當歸一分

右六味。以清酒煉羊髓二過。㕮咀諸藥。煎膏成。絞去滓。用小豆大。内鼻中。日三。

治竹木所刺入手足壯不出膿。疼痛。羊屎膏方

右取乾羊屎搗篩。用猪脂和。以塗之。瘡口立出。

治湯淚人宍爛壞。朮膏方

朮二兩　附子二枚大者炮　甘草二兩　羊脂五兩　松脂雞子大一塊　猪脂五兩不入水者

右六味微火上煎猪脂後內羊脂幷諸藥又煎膏成絞去滓候凝塗瘡上日三

又方

栢樹皮四兩去黑處　甘草三兩細切　淡竹葉二兩切

右三味以不中水猪脂一升二合入藥煎膏成絞去滓塗瘡上日三

又方

麻子一合取人　栢皮一兩取白　白芷一兩　生柳皮一兩去白

右四味㕮咀以脂一升同藥煎膏成濾去滓候凝傅瘡日三

治癰疽疥癬及惡瘡蘆茹膏方

蘆茹三兩漆頭者　雄黃　雌黃末各一兩　丹砂一兩研　亂髮半兩洗

右五味搗篩令調煎以先用猪脂二升半煎髮取盡內諸藥微火更煎候膏成不令他人雞猫犬見傅瘡上日三

治婦人妬乳生瘡雌黃膏方

雌黃　白斂　雄黃　漆頭蘆茹各一兩　亂髮一團如雞子大

右五味各研搗篩以不中水猪脂二升先煎亂髮令盡下諸藥再微火煎候膏成放凝塗瘡上日三四

治諸惡瘡麝香膏方

麝香　冷石　雄黃　丹砂各五分

右四味各細研如粉以臘月猪脂量其多少調和如塗傅瘡時先用大黃湯放溫洗了淹乾然後塗膏

治頭瘡惡瘡骨疽等牛屎薰方

取苦瓠截除底斷其鼻取牛屎著地上燒以無底瓠籠屎上引煙從瓠空中出以瘡著煙上薰之自然止過三度即除

六物滅瘢膏方

衣中白魚　雞屎白　鷹糞白　芎藭　白斂　白蜂等分

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良

小品滅瘢方

雞矢白一兩　辛夷人四分　白附子二分　細辛二分

右四味酒浸一宿以羊脂六合限火煎三上三下去滓傷瘢以甘草湯洗訖塗之一方有桂心二分

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三

秘製大黃清寧丸方

孫思邈撰

本館據平津館叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

祕製大黃清寧丸方

製大黃丸方序

內府傳有十五製大黃丸方。家大人每歲如法製成。以施病者。不論何疾。一服輒愈。適刊素女方。因附于後以廣其傳。昔家眞人思邈少嬰羸疾。博究醫術。撰千金方、千金翼方。集醫學之大成。星衍亦病俗醫不學。喜搜羅醫方古書。訂證神農本經三百六十種刊宋本華氏中藏經。然試之治疾。惟製大黃最神効。大黃于本草爲下品。而無毒無所畏。本經稱其主下瘀血血閉寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五藏云云。張仲景治傷寒多用之。宋人法帖載唐張旭草書云。忽肚痛不可堪。不知是冷熱所致。永若。一作服大黃湯。冷熱皆有益。據此則知大黃不獨治熱病。今俗以寒疾不宜服大黃者非也。古人以單方治疾。或以數十種藥合作丸散。兼治各種疾。如華陀書所載萬應圓。或用湯液。則出於伊尹。及張仲景。必有一藥爲之君。配以臣佐及使分量。按五行之數。俾行五藏。今人既不解診脈。不知疾在何所。因試之以藥十餘種。輕重任意。不得主宰。不按古方。疾既委頓。乃復以藥治藥。故漢人有不服藥爲中醫之論。豈不然乎。病有汗吐下三法。而汗吐輒耗元氣。致損食啖。惟下之速愈。而大黃奏効尤神。陶隱居謂其有將軍之號。且經十五製。其性已化。多從小便下達。不致瀉利。是以塞外求大黃。比于中原之求人蔘。而此製大黃方。亦自都下通行海內。但俗醫惡其速効。遏抑之。率稱不可服。因爲考古。敍

其證驗云。五松居士書。時辛未歲二月九日。

祕製大黃清寧丸方

係內府所傳。遇諸般病症。每用不過三錢。神效無比。但藥材要好。炮製須照原方。各隨症加引。方見奇功。仁人君子能修合廣施。實陰德之一助。

錦文大黃數十斤。或十斤。用布拭去毛。以米泔水侵半日。切片晒乾。每斤入無灰好黃酒半斤。浸三日。取出。晒大半乾。用好陳酒浸更佳。

第一次。用側栢葉。鋪墊甑底。並蓋藥上。將大黃蒸至一炷香久。取出。晒乾。每次蒸。俱另用側栢葉蓋墊。蒸過不用。

第二次。用菉荳熬濃汁。將大黃拌透。蒸一炷香久。取出。晒乾。自後每次拌汁蒸晒。俱照前法。

第三次。用大麥熬濃汁。凡菉荳。大麥。黑等荳。每大黃一斤。約用二三合。熬汁。拌透。蒸晒。

第四次。用馬料荳熬濃汁。

第五次。用槐葉熬濃汁。

第六次。用桑葉熬濃汁。

第七次。用桃葉熬濃汁。

第八次。用鮮車前葉熬濃汁。

以上四葉大黃一斤。每重約用二三兩。熬汁。拌透。蒸晒。

第九次。用厚朴熬濃汁。

第十次。用陳皮熬濃汁。

第十一次。用半夏煎汁。

第十二次。用白朮煎汁。

第十三次。用香附煎汁。

第十四次。用黃芩煎汁。

以上諸藥。每大黃一斤。各用一兩。煎汁拌透。如前蒸晒。

第十五次。每大黃一斤。用無灰好陳酒一斤。拌透晒乾。再蒸三炷香時。取出晒乾。磨爲細末。每藥末一斤。用黃牛乳。如無。以練過熱蜜二兩代之。眞童便。姜汁。各二兩。拌勻。用木杵搗千餘下。如天時乾燥。須將煉過好白蜜。漸加漸搗。使乾濕得所爲佳。丸如桐子大。晒乾。盛貯磁器中。蓋好。勿使泄氣。每服大人三錢。小兒一錢。俱照後症用引。煎湯送下。累試累効。至神至奇。

清寧丸治諸症湯引

一。頭痛牽連兩眉稜骨者。（係痰火。）姜皮燈心湯下。左邊痛者。柴胡湯下。右邊痛者。桑白皮湯下。兩太陽痛者。白芷石膏稾本各三錢煎湯下。頭頂作痛者。稾本三錢升麻一錢煎湯下。

一。頭腦雖痛。身不發熱。口中發渴。（亦係痰火。）用薄荷湯下。

一。時時頭暈。（亦係痰火。）燈心湯下。

一。眼痛初起。疼腫異常。先用羌活白芷甘菊花（各一錢二分。）川芎大黃（各一錢。）紅花（三錢。）枳殼陳皮（各八分。）甘草赤芍（各四分。）葱頭（三個。）水（二碗。）煎熱服。次日方服此丸。用菊花煎湯下。無不効。

一。眼害久不愈。歸身（一錢。）菊花（二錢。）煎湯下。

一。遇勞碌。兩眼卽痛。內見黑花。龍眼肉（七枚。）煎湯下。

一。鼻上生紅瘡紅點。（心火上炎。熏灼肺經所致。）用桑白皮燈心煎湯下。非服二三十次。不能奏效。

一。鼻孔生瘡。枇杷葉（三錢。）煎湯下。

一。耳暴聾。燈心湯下。

一。耳內作癢。燈心湯下。

一耳鳴。心腎不足。痰火生之故。淡鹽湯下。

一口舌生瘡。是胃火上升。竹葉燈心湯下。冬月用竹葉。

一口唇腫脹。茯苓燈心湯下。

一口唇腫硬生瘡。生甘草三錢。煎湯下。

一咽喉腫痛。津液難嚥。桔梗甘草湯下。

一牙齒痛。石膏升麻各三錢。煎湯下。

一老年人牙齒常疼。虛火。燈心湯下。

一單雙乳鶩牛膝煎湯下。

一嗽血。麥冬湯下。

一吐血。紅花一錢。煎湯。入童便半杯下。

一吐紫血成塊。名爲蓄血。用紅花歸尾甘草稍各三錢。同煎。入童便半杯。無灰好陳酒半杯服。

一鼻血不止。燈心湯下。

一。左癱右瘓。秦艽三錢。生姜一片。煎湯下。

一。從高墜下。跌傷身體。蓄血在內。不思飲食。蘇木五錢。煎湯。入童便。好陳酒。各半杯。每服五錢。

一。溺血。管中疼痛者。麥冬湯下。

一。溺血。或身體壯實。平日喜食熏炙者。燈心湯下。

一。溺血。或年老體弱者。膀胱蓄熱。腎水不行之故。宜早服六味丸。晚服此丸。淡鹽湯下。

一。溺血于盆中。少頃如魚如蝦。如絮如石。因自奉不謹。心腎不足所致。牛膝一兩。水二碗。煎至一碗。服此丸三錢。

一。大便糞前下血者。歸身二錢。生地白芍川芎各一錢。煎湯下。

一。大便糞後下血者。槐花地榆各一錢。煎湯下。

一。大便或純血帶紫色者。紅花湯下。

一。大便純鮮血者。當歸湯下。

一。遺精者。淡鹽湯下。

一。白濁。燈心湯下。

一。淋症。燈心湯下。

一淋症兼痛者。海金沙三錢。煎湯。濾清。下。

一胸膈有痰火。燈心湯同姜汁下。

一胸中時痛時止。口吐酸水。橘餅半個。煎湯下。

一胸膈飽脹。及作酸。姜湯下。

一胃脘作痛。飲食減少。姜湯下。

一傷寒發熱。解散出汗後。尚有餘熱未盡。白滚湯下。

一傷寒後。胸膈不寬。百藥無效者。用多年陳香櫞一個。搥碎。取長流水二碗。煎至一碗。去渣。露一宿服。

一嘔吐。煨姜煎湯下。

一吐痰涎。姜汁沖湯下。

一乾嘔。姜湯下。

一傷風久嗽者。姜湯下。

一久嗽無痰。乾咳者。麥冬湯下。

一傷風咳嗽。發汗後餘熱已退。仍咳嗽不止者。姜湯下。

一咳嗽。吐黃痰者。姜湯下。

一。咳嗽。吐白痰者。紫蘇湯下。

一。久嗽有痰。諸藥不效者。陳酒或姜皮一錢。三五分酌用。姜湯下。

一。久嗽。聲啞者。柯子麥冬湯下。

一。發熱久不退。柴胡湯下。

一。煩渴。忌飲不休。燈心湯下。

一。痢疾初起。或純白者。姜湯下。

一。痢疾初起。或純紅者。槟榔紅花湯下。

一。紅白相間者。姜皮燈心湯下。

一。久痢不止者。炙甘草湯下。

一。噤口痢不止。飲食不進。陳米湯下。

一。胸中作酸。姜湯下。

一。胸中作嘈。姜皮湯下。

一。濕痰流注初起者。姜湯下。孕婦忌服。

一。五臟停痰。姜汁沖湯下。

一。胸膈飽滿。姜汁沖湯下。

一。背心常作痛。又作冷。雖伏天亦怕冷者。此乃五臟各處。多有停痰。煨姜煎湯下。

一。肥人素善飲無病。忽然昏沉。如醉如癡。或蹲地不起。眼生黑花者。痰也。姜湯下

一。傷酒。甘菊花煎湯下。

一。眼眶下忽如煤色者。痰也。姜汁沖湯下。

一。水腫。麥冬赤芍煎湯下。久病發腫者不宜。

一。噎膈。姜湯下。若有至五十日不治者。此丸能救之。用四物湯服。川芎。白芍。生地。當歸。

一。中暑者。姜皮燈心湯下。

一。中熱者。香薷湯下。

一。暑瀉。香薷湯下。

一。寒伏暑霍亂者。姜湯下。

一。暑伏寒霍亂者。姜皮湯下。

一。陰陽不和霍亂者。姜湯下。

一。哮喘。大腹皮湯沖服。

一。肥人多痰。姜汁下。

一。盜汗。浮小麥煎湯下。

一。自汗。浮小麥湯下。久用圓眼湯。

一。驚悸怔忡症。石菖蒲汁沖湯下。

一。夜不能寐。炒酸棗仁煎湯下。

一。大便結燥。當歸湯下。

一。小便不通。燈心湯下。

一。癲狂病。燈心湯下。

一。老年痰火。夜不能寐。氣血不和。眞廣皮三錢。煎湯。磨木香五分沖服。

一。身體時時作癢。纍塊如紅雲。風熱也。久則成痲風。菊花湯下。

一。眼目歪邪。出言無緒。罵詈不堪。頃刻又好。心胸經絡有痰。遇火熏蒸。痰入心竅。故昏惑狂言。少頃。心火下降。仍復清明。用茯苓三錢。湯下。非數服。不能愈。

一。咳嗽吐痰。醒臭如濃血。胸中作痛者。肺癰也。苡仁一錢。煎湯下。

一。大腸癰。肛門墜痛。或登厠。並無糞出。但有紅白水。如痢疾者。槐米湯下。

一。小腸癰。腹中疼痛。臍內出膿水。小便短少者。燈心湯下。

一。四肢無力。遍身筋骨。疼痛異常。反側艱難者。木通一兩。水二碗。煎至一碗。下四錢。三服立愈。

一。年老。大便結燥。當歸四錢。煎湯下。

一。黃疸。皮膚兩眼如黃金色者。茵陳三錢。煎湯下。

一。蠱脹。大腹皮湯下。

一。跌打損傷。蓄血不行。不思飲食。蘇木湯。加童便服。

女科諸症

一。骨蒸發熱。地骨皮湯下。

一。潮熱盜汗。浮小麥湯下。

一。胸有痰涎。姜湯下。

一。胸膈不寬。香附三錢。煎湯下。

一胃脘時時作痛。良姜湯下。

一常常噯氣。不思飲食。悶悶不樂。有憂鬱之痰。香附五錢。姜三片。同煎下。餘症。與男子同。

行經

一經水不調。用四物湯。川芎當歸白芍生地各一錢。煎服。

一凡行經時。血氣紫。腹中作痛。蘇木三錢。同煎。入姜汁三匙下。

一行經時身痛。益母草湯下。

胎前

一孕婦小便不通。燈心湯下。

一孕婦遍身發腫。大腹皮湯下。

產後

一產後惡露不盡。腹中作痛。益母草五錢。煎湯。入童便半杯服。或加蘇木三錢。與益母草同煎。亦可。

一產後小便不利。木通湯下。

一產後頭暈目暗。四物湯下。川芎。當歸。白芍。生地。

一產後大便不通。肛門壅腫。歸身三錢。紅花一錢。同煎服。

一產後發熱。四物湯加益母草三錢。同煎服。

一產後嘔吐不止。藿香湯下。

一乳汁不通。王不留行煎湯下。

小兒諸症

一小兒初生啼聲未出。急將口中汚血拭淨。用甘草五錢。煎湯。研丸爲末。七錢。調稠。灌下。能去一切胎毒。

一小兒吐乳。姜湯下。

一小兒夏日中暑。藿香湯下。

一胎黃。茵陳湯下。

一小便不通。燈心湯下。

一大便結燥。蜜三匙。沖湯下。

一暑瀉。燈心湯下。寒瀉忌服。

一慢驚風。人參三分。勾藤一分。煎湯下。

一急驚風。勾藤薄荷各一錢。煎湯下。

一天吼。薄荷勾藤湯下

一喘症癎症。燈心湯下。

一黃疸。燈心湯下。

一重舌。燈心湯下。

一霍亂。藿香湯下。

一瘧疾。檳榔蘇葉煎湯下。

一嘔吐。姜湯下。

一鼻血不止。白茅根搥爛。絞汁。沖湯下。

一傷風熱退夜嘔。薄荷湯下。

一痧後。咳嗽不止。枇杷葉湯下。

一痧後。發熱不退。用銀柴胡三錢。煎湯下。

一中風腫痛。蒼朮三錢。煎湯下。

一小兒幼時不知人事。久雨乍晴。蹲在地上頑耍。致濕氣浸入。睡臥不安。夢中啼哭。勾藤薄荷各三錢。煎湯服。

一小兒身上如紅雲。外以朴硝大黃等分。研末。雞蛋白調敷。再用燈心。服此丸。

一小兒肝疳。面青體瘦。目黃性急。發熱不止。小便黃赤。喜食酸物。銀柴胡湯下。

一脾弱。面黃體瘦。大便泄瀉。唇口生瘡。喜食甜物。多食無厭。或好吃泥土。喜睡。炙甘草一錢。元棗一錢。煎湯下。

一腎疳。面黑體瘦。頭髮直豎。小便多熱。不食。喜食鹹物。桑白皮湯下。

一肺疳。面白體瘦。小便如米湯色。鼻流清涕。周身毫毛直豎。馬料豆煎湯下。

一心疳。面紅舌赤。發熱。體瘦。小便短少。喜喫辛物。茯苓一錢。燈心五錢。煎湯下。

一小兒痢疾諸症。俱照大人所用引服。月內小兒。每服分作三次服。

王雲五主編

叢書集成初編

劉涓子鬼遺方及其他一種

中華民國二十六年六月初版

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

（本書校對者朱賓文徐鼎銘）

鎮　E九八三